

آپریشن کے ذریعے ہونے والی زچگیاں

ڈسچارج کے بعد کی ہدایات

اس بروشر میں ڈسچارج کے بعد کی احتیاطی تدابیر فراہم کی گئی ہیں۔ یہ اقدامات مریض کی پرسکون بحالی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ مزید سوالات یا کسی مسئلے یا سوال کی صورت میں برائے مہربانی اپنے ڈاکٹر یا نرس سے رابطہ کریں۔

ہم آپ کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں

درد کی دیکھ بھال

ہسپتال سے ڈسچارج ہوتے وقت آپ کو درد کش ادویات دی جائیں گی۔ آپ اپنی معمول کی ادویات اس وقت تک لے سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا ڈاکٹر منع نہ کرے۔ کسی نئے درد یا درد کی شدت میں اضافے کے بارے میں اپنے ڈاکٹر کو مطلع کریں۔

زخم کی دیکھ بھال

- آپریشن کے بعد ہونے والے زخم کو ٹانگوں یا سلائی کے ذریعے جوڑا جائے گا جنہیں آپریشن کے ایک ہفتے بعد کھول دیا جائے گا۔
- زخم پر باندھی جانے والی پٹی آپریشن کے 48 گھنٹوں بعد ہٹادی جائے گی۔
- زخم کو صاف اور خشک رکھیں۔
- زخم پر دوبارہ پٹی نہ باندھیں اور نہ ہی کوئی مرہم یا پاپاؤڈر لگائیں۔
- غسل کے دوران ٹانگوں کے مقام کو صابن اور گرم پانی کی مدد سے نرمی سے صاف کریں اور اس کو نرمی سے خشک کریں۔ ٹانگوں کے مقام کو 24 گھنٹوں میں ایک بار یا حسب ضرورت صاف کریں۔
- کھانتے یا چھینکتے وقت زخم کو ہاتھ کی ہتھیلی، تولیے یا تیکے سے سہارا دیں۔

خوراک

آپ معمول کی خوراک لے سکتے ہیں تاہم قبض سے بچنے کے لیے ریشے والی اشیاء اور مائع کی زیادہ مقدار استعمال کریں۔ اگر قبض ہو جائے تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس کے مشورے کے مطابق قبض کش ادویات استعمال کریں۔

معمول کی سرگرمیاں

- گھریلو کام آپریشن کے فوراً بعد آپ اپنی معمول کی سرگرمیاں شروع کر سکتے ہیں۔ ہیپلوک فلورا ایکسرسائز کی ہدایات ہسپتال میں قیام کے دوران آپ کو دی گئی تھیں، اب ان پر عمل شروع کر دیں اور اپنی گھریلو سرگرمیوں مثلاً سبزی کاٹنے یا استری کرنے کے دوران جاری رکھیں۔ تاہم خیال رکھیں کہ ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کا جسم بیٹھنے کے دوران پرسکون حالت میں ہو۔
- نوکری: جب تک آپ کا ڈاکٹر مشورہ نہ دے کام کا آغاز نہ کریں۔ بحالی کے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے عام طور پر ایک سے چار ہفتے تک آرام کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
- ڈرائیونگ کا آغاز اس وقت کریں جب آپ کا درد مکمل طور پر ختم ہو چکا ہو اور آپ آرام کی حالت میں ہوں۔
- جنسی معمولات: آپریشن کے چھ ہفتے بعد اگر آپ پرسکون ہوں تو جنسی معمولات کا آغاز کر سکتے ہیں۔

درج ذیل افعال سے گریز کریں

تھکا دینے والی ورزش مثلاً جوگنگ یا دوڑنا جب تک ڈاکٹر اجازت نہ دے

- آپریشن کے بعد دو یا تین ہفتوں تک زمین پر بیٹھنا • قبض یا رفع حاجت کے لیے دباؤ ڈالنا • بھاری وزن اٹھانا یا کھسکانا

اگر آپ درج ذیل علامات میں سے کوئی محسوس کریں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں

- زخم کی جگہ پر سرخی، سوجن یا مواد کا اخراج • 101-102 ڈگری فارن ہائٹ یا اس سے زائد بخار • اگر زخم کھلنے لگے
- زخم سے بو آنے لگے
- زخم سے بو آنے لگے
- درد میں اضافہ یا غیر معمولی درد
- پیشاب کرنے میں تکلیف
- پیٹ کا پھولنا
- زخم سے خون کا اخراج
- ویجائنا سے زیادہ یا بدبو دار مائع کا اخراج

مزید رہنمائی اور معلومات کے لیے رجوع کیجئے: کھارادر جنرل ہسپتال: فون نمبر: (021) 111 544 544

