

خون کی کمی (اینیمیا) کے مریضوں کی دیکھ بھال

ڈسپانچر کے بعد کی ہدایات

اگر بروشر میں ڈسپانچر کے بعد کی احتیاطی تدابیر فراہم کی گئی ہیں۔ یہ اقدامات مریض کی پرسکون بحالی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ مزید سوالات یا کسی مسئلے یا سوال کی صورت میں برائے مہربانی اپنے ڈاکٹر یا نرس سے رابطہ کریں۔

ہم آپ کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں

اینیمیا

اینیمیا ایک ایسی حالت ہے جس میں خون کے سرخ صحت مند ذرات یا ہیموگلوبن (خون کے خلیات کا وہ جزو جو جسم کے تمام ٹشوز تک آکسیجن پہنچاتا ہے) کی مقدار غیر معمولی حد تک کم ہو جاتی ہے۔

ڈسپانچر کے بعد کی احتیاطی تدابیر

ادویات

- آپ تجویز کردہ ادویات کا استعمال شروع کر سکتے ہیں۔ نرس ادویات اور ان کے ضمنی اثرات سے آپ کو آگاہ کرے گی۔
- ڈاکٹر یا نرس سے مشورے کے بغیر ادویات کا استعمال ترک نہ کریں۔
- وٹامن سی ایسکو ربک ایسڈ) استعمال کریں یا آئرن کی گولیوں کے ساتھ موسمی کارس پیئیں۔

درج ذیل صورتوں میں آئرن کی گولیاں نہ لیں

- اینٹیڈزنیٹائیٹراسائیکلین (اینٹی بائیوٹکس) لینے کے دو گھنٹوں کے دوران
- کچھ مخصوص کھانوں، کیمیائی مادوں اور غذائی اجزاء (مثلاً چائے، کافی، چاکلیٹ اور ایسے تمام مشروبات جن میں کیفین کی زیادتی ہو) کے ساتھ
- دودھ یا کیشیم سے بھرپور دوسری اشیاء کے ساتھ
- ریشے دار اشیاء مثلاً بران، بغیر چھنا آنا، پھلوں کی گری یا کچی سبزیوں کے ساتھ

خوراک

چونکہ اینہمیا غذائی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے ایسی خوراک استعمال کریں جس میں آئرن زیادہ ہو مثلاً مرغی کی کلیجی، گائے کی کلیجی، گائے کا گوشت، ناشتے میں لیے جانے والے سیریلز، پکی ہوئی پھلیاں اور دالیں، سکے اور بغیر چھلے ہوئے آلو، سبز پتوں والی سبزیاں، انڈے، سیب، کھجوریں، چیکو وغیرہ۔

سرگرمیاں

جسمانی سرگرمیوں میں بتدریج اضافہ کریں۔ ایسی سرگرمیوں سے پرہیز کریں جن سے سانس پھولنے لگے یا تھکن ہو۔ اگر ہیموگلوبن ڈاکٹر کی تجویز کردہ سطح تک آجائے تو آپ معمول کی سرگرمیوں کا آغاز کر سکتے ہیں۔ حادثات، تھکا دینے والی جسمانی سرگرمیوں، شراب، این ایس اے آئی ڈیز (سوزش ختم کرنے والی ایسی دوا جس میں اسٹیرائڈز نہ ہوں) اور اینٹی پلٹیلیٹ ایجنٹس (ایسی ادویات جو خون کو جمنے سے روکیں) سے پرہیز کریں۔

درد

عام طور پر ڈسپاچر کے وقت درد نہیں ہونا چاہیے۔ کمزوری کی وجہ سے آپ کو ہلکی پھلکی تھکن کا احساس ہو سکتا ہے جو بتدریج ختم ہو جائے گی۔ اگر زیادہ دیر تک درد رہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

خطرے کی علامات

- قے میں خون آئے یا وہ پھینٹی ہوئی کافی جیسی ہو
- فضلے کا رنگ میرون یا کالا ہو یا اس میں بہت خون آئے
- جسم سے خون نکلتا
- سرچکرار ہا ہو یا آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے
- تھکن اور کمزوری جاری رہے یا اس میں اضافہ ہو رہا ہو
- آئرن کی گولیاں استعمال کرنے سے متلی، قے قبض، دست یا سینے میں جلن جیسی شکایات